




Reanimatie zwangere

Basic Life Support / Advanced Life Support



Tijdens reanimatie

IV toegang (of intra-ossaal)

Overweeg intubatie (en capnografie) → geef dan ononderbroken thoraxcompressies

Adrenaline 1 mg i.v. à 3 - 5 minuten

Bij shockbaar ritme: Amiodaron 300 mg i.v. (na 3e shock) en 150 mg (na 5e shock)

Denk aan 4 Hs en 4 Ts



ATLS - Trauma bij zwangere

“Treat first what kills first”

SHOT

Hulp	roepen & laten bellen
Oxygen	10-15 L over non-rebreathing masker
Tilt	Left lateral tilt / manual uterus displacement (MUD)

A

Ademweg

Obstructie

Cervical wervelkolom stabiliseren (manueel of head blocks)

Vrij? Zo nodig jawtrust (geen chinlift), evt. met mayo-tube
Obstructie? Uitzuigen, intubatie, z.n. chirurgische luchtweg

B

Breathing

Spanningspneu
Hematothorax
Pneumothorax
Fladder thorax
Tamponade

Ademfreq? Saturatie? Trachea midline? Ademgeruis?
Inspectie, auscultatie, palpatie, percussie.
Dien 10-15 L O₂ toe over NRM. Beadem op de kap zo nodig.

C

Circulatie

Hypovolemie

MUD – manual uterus displacement
Pols? RR? Capillary refill?
2 infusen
Ruim vullen met NaCl 0.9% (drukkzak, verwarmd)
Bloedafname
VBB, stolling, kruisbloed, leverfx, nierfx, gluc
Bloed bestellen → O-negatief
4 PC + 4 FFP (evt. trombo's)
Overweeg **Tranexaminezuur 1 gram** à 10 min
4 B's borst – buik – bekken – benen - overweeg **FAST-echo**
Buik ontbloten en VT: vaginaal bloedverlies?

Laat gynaecoloog & anesthesist bellen

D

Disability

Neuro-trauma
Hypoglycemie

Bewustzijn **AVPU** (alert, voice, pain, unresponsive).
Glasgow Coma Scale (E₁₋₄M₁₋₆V₁₋₅). Pupilreactie (PEARL)?
Do not forget the glucose!

E

Exposure

Hypothermie

Kleedt volledig uit. Log-roll + RT. Temperatuur meten.
Warm toedekken, trendelenburg.

F

Foetus

AD > 27 weken → Echo: Cortonen?

Secondary survey

ABCDEF stabiel → Volledig onderzoek + beeldvorming



Anafylaxie

S Stop alle medicatie

H Hulp Verpleging, arts, anesthesist

O Oxygen, 10-15L non-rebreathing mask

T Tilt (left lateral)

Symptomen < 2 uur ontstaan:

- Hypotensie (RRs <90)
- Gegeneraliseerde jeuk, urticaria,
- Angio-oedeem, kuchen, stridor
- Misselijkheid, braken, diarree

Laat de tijd bijhouden

A Ademweg

Vrij? Zo nodig chinlift, jawthrust, mayo-tube

B Breathing

Ademfreq? Saturatie? Ademgeruis?

Dien 10-15L O₂ toe over non-rebreathing masker

Ademfreq <9/min en/of <94% → Masker + ballon

C Circulatie

RR? Pols?

2 infusen en fluid challenge 500 mL NaCl 0.95% in 15 min

Medicatie

Adrenaline 0.5 mg i.m.

Clemastine (Tavegil) 2 mg i.m. / i.v.

Salbutamol 5 mg vernevelen (bij bronchospasmen)

Dexamethason 8 mg i.v.

Ruim vullen met NaCl 0.9% o.g.v. bloeddruk

D Disability

AVPU (alert, verbal, pain, unresponsive)

Don't forget the **glucose!**

E Exposure

Temperatuur meten + warme dekens

F Foetus

CTG, echo

Overweeg IC-opname

Observeer minimaal 4 uur (minimaal 12 uur bij hypotensie)

Indien geen herstel < 5 min
Laat reanimatieteam en
anesthesist komen