



Maternale sepsis

HOT

Hulp → roepen & laten bellen

Oxygen → 10-15 L over non-rebreathing mask

Tilt → Stabiele zijligging

A Ademweg

Vrij? Zo nodig chinlift of jaw thrust, mayo-tube

B Breathing

Ademfreq? Saturatie? Ademgeruis?

10-15L O₂ (100%) over non-rebreathing masker

C Circulatie

Zwanger? → Left lateral tilt / stabiele zijligging
RR? Pols?

Infuzen, 2 groene of grijze (grote) naalden

Bloed afnemen:

- **Lab**, uitgebreid, incl. lactaat (zie onder ¹)
- **Bloedkweken**
- **Bloedgas** (veneus, arterieel)

NaCl 0.9% / Ringer's 30 mL/kg in 30 min (drukkzak)

CAD, urimeter, **urinekweek**

Maternale sepsis

Verdenking infectie
en min. 2 criteria:

Ademfreq ≥ 20 /min

Pols ≥ 100 /min

Leuko ≥ 17

Temp <36 of > 38

Streefwaarden

RR systole 90-150

RR diastole 50-100

Pols 55-100/min

Temp 36.0 – 37.8 °C

Ademfr. 11-20/min

Saturatie 95-100%

UP > 0.5 mL/kg/u

D Disability

AVPU (alert, verbal, pain, unresponsive) of EMV

Don't ever forget the **glucose!** (vingerprik)

E Exposure

Temp meten. Paracetamol. Mammae / benen?

ANTIBIOTICA < 1 uur

na afname bloedkweken

Cefotaxim 1000mg 4dd of Augmentin 1000/200mg 4dd

Amikacine 15 mg/kg eenmalig

Oplossen in 500mL NaCl 0.9%, niet sneller dan 30 minuten laten inlopen

F Foetus

Cortonen (evt. CTG). **Fluorkweek.**

Echo abdomen / X-thorax (evt. CT-abd/thorax)

Reassess SEOWS score

¹ Lab

Bloedbeeld Hb, Ht, trombo, leuko

Bloedgroep / rhesus / kruisbloed

Chemie CRP, gluc, creat, ureum, AST, ALT,
LDH, bili, Na, K, Ca, Mg, fosfaat, chloride

Bloedgas + lactaat Direkt naar lab of op ijs

Buis **Kleur**

EDTA

EDTA

Heparine

NaF

Paars / roze

Paars / roze

Groen

Grijs



SEOWS

Suriname Early Obstetric Warning Score

	3	2	1	0	1	2	3
Ademfrequentie /minuut	0-10	-	-	11-20	21-25	26-30	> 30
Temperatuur In °C		<35	35.0-35.9	36.0-37.5	37.6-38.4	≥ 38.5	
Hartfrequentie /minuut	< 40	-	40-59	60-99	100-109	110-130	> 130
RR systole mm Hg	< 70	70-89	90-99	100-139	140-149	150-159	≥ 160
RR diastole mm Hg	-	-	<50	50-89	90-99	100-109	≥ 110
Neuro -	-	-	-	Alert	Voice	Pain	Unresponsive
Urineproductie mL/u	< 25	25-30	30-50	>50			
Saturatie %	< 90	91-94		95-100			

Score	Acties verpleging / verloskundige	Controles	Acties arts
0	Geen	8 uur	Geen
1	Collega op de hoogte	4 – 8 uur	Geen
2-3	Arts op de hoogte brengen (<30 min) Oorzaak opheffen Waaknaald	1 uur	Bespreek eventueel verdere acties Beoordeel patiënt indien oorzaak niet direkt op te heffen
3 op één punt of 4-5	Arts z.s.m. op de hoogte brengen (<15 min) Geef 10-15 L O2 over non-rebreathing mask Sluit saturatiemeter aan Twee infusen Plaats CAD en houdt vochtbalans bij	30 min	Beoordeel patiënt < 30 min Diagnostiek / oorzaak opheffen Overleg met gynaecoloog Anesthesist op de hoogte
≥ 6	Arts z.s.m. op de hoogte brengen (<15 min) Geef 10-15 L O2 over non-rebreathing mask Sluit saturatiemeter aan Twee infusen Plaats CAD en houdt vochtbalans bij	15 min	Beoordeel patiënt < 15 min Diagnostiek / oorzaak opheffen Overleg met gynaecoloog Overleg met anesthesist Overweeg overplaatsing ICU