



Fluxus post partum

Hulp!

Noodbel / roepen / waarschuw arts / gynaecoloog

Preventie hoog risico patiënt

1. Infuus, afname Hb / kruisbloed
2. Oxytocine 10EH im of 5EH iv in 1 min
3. Vroeg afnavelen
4. Controlled cord traction
5. Uterus massage

A Ademweg Vrij? Zo nodig chinlift / jawtrust, mayo-tube

B Breathing Ademfreq? SpO₂?
Dien **10-15L O₂** toe over non-rebreathing masker

C Circulatie
Pols? RR?
Uterus massage continu
2 infusen groene naald + lab
Oxytocine + vullen
Blaas legen (CAD)
Weeg / meet bloedverlies
Bloed bestellen (2 PC : 2 FFP)
Trendelenburg / benen hoog

Infuus 1
Groene naald

Infuus 2
Groene naald

Oxytocine
10 EH im of 5 iv (in 3 min)
én
10 EH à 4 uur in kolf NaCl 0.9%

NaCl 0.9% (drukkzak, verwarmd)
Max. 2 liter (o.g.v. RR)
Z.s.m. bloed transfusie

Oorzaken

Tone

Trauma

Ruptuur (perineum, cervix, uterus)

Tissue

Placentarest

Trombine

Stollingsstoornis

Na 4e bloedproduct: 1g calciumgluconaat

Cyclokapron (tranexaminezuur) 1 gram i.v. vanaf $\geq 500\text{mL}$ bloedverlies

Continu uterusmassage
Hechten
Manuele placenta verwijdering

Uterotonica
Methergine 0.2eh im/iv
Misoprostol 800mcg subling / rectaal

D Disability **AVPU** alert, voice, pain, unresponsive and Don't forget the glucose (vingerprik)

E Exposure Voorkom afkoeling + kind aan borst bij atonie + benen omhoog

Naar OK binnen 30 min onafhankelijk van oorzaak

Natasten + evt. intra-uteriene ballon plaatsen
Chirurgische: B-lynch, ligatie vaten, hysterectomie

Verricht bimanuele uteruscompressie / aorta compressie

Plaats een intra-uteriene ballon (+ geef antibiotica)

Plaats de Non-pneumatic Anti-Shock Garment (NASG)

Indien u niet direct naar OK kan

Persisterend bloedverlies



Fluxus post partum (2)

	Dosis	Contra-indicaties	Bijwerkingen
Uterotonica			
Oxytocine = Syntocinon®	10 eh iv of im direct (2x) + 10 eh à 4 uur Kolf 60 druppels/min Pomp st. 12.5 (2.5 eh/u)	Geen	Hypotensie Tachy /bradycardie Hoofdpijn Misselijk / braken
Methylergometrine = Metherin ©	0.2 mg iv of im Zo nodig elke 2-4 uur herhalen, max 5 x / 24u	PE / HELLP Uterus myomatosus Relatief: Vastzittende placenta	Hypertensie Hoofdpijn Huiduitslag Convulsies
Misoprostol = Cytotec ©	800 mcg sublinguaal of oraal	Geen <i>Echter weinig tot geen toegevoegde waarde boven op oxytocine</i>	Diarree Huiduitslag Hoofdpijn Koorts
Antifibrinolytica			
Tranexaminezuur = Cyclokapron ©	1000 mg (1 gram in 10mL) iv in 10 minuten Bij aanhoudend bloedverlies herhalen na 30 min (max 3x)	Actieve trombo- embolie Ernstige nierinsufficiëntie	Misselijk / braken Diarree Huidreacties Zelden: trombopenie en convulsies
Lab en buizen			
Bloedbeeld	Hb, Ht, MCV, Trombo, Leuko	EDTA	Paars / roze
Kruisbloed	Bloedgroep, rhesus, IRAS	EDTA	Paars / roze
Stolling	APTT, PT, INR, fibrinogeen	Citraat	Blauw
Telefoonnummers			
		OK-team	
		Apotheek	
ICU		Lab	
Anesthesist		Bloedbank	